

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE


Disciplina: Complementos de Matemática Aplicada - Biomedicina e Ciências Ambientais

Lista de exercícios 2

Professor: Bruno Santiago

Exercício 1. O gráfico abaixo foi gerado apenas com os dados da tabela. Determine em quais

<i>Tempo (min)</i>	<i>Temperatura (°C)</i>
1	6.8
2	16,11
3	25
4	33
5	42.2
6	50
7	57.38
8	65.11
9	72.16
10	79
11	85.55



intervalos de tempo houveram a menor e a maior taxa de variação de temperatura. Em seguida, proponha uma função afim $f(x) = ax + b$ cujo gráfico aproxima os dados da tabela e proponha uma maneira de medir o erro que a sua aproximação comete.

Solução. Observe que a tabela é composta por 11 entradas. Vamos denotar a entrada na posição i por $v(i)$. Assim, $v(1) = 6.8$, $v(2) = 16.11$ e assim por diante até $v(11) = 85.55$. A taxa de variação entre no intervalo entre um determinado minuto e o minuto seguinte pode ser calculada da seguinte maneira: dado o minuto i , a taxa de variação entre i e $i + 1$ é

$$t(i) = \frac{v(i+1) - v(i)}{i+1 - i} = \frac{v(i+1) - v(i)}{1}.$$

Utilizando o computador, podemos calcular $t(i)$ para cada i , e vemos como isso que $t(1) = 9.31$ e $t(10) = 6.54$ são, respectivamente, a maior e a menor taxas de variação nos 10 intervalos de tempo.

Em seguida, para propomos como função afim que aproxima os dados da tabela iremos escolher a função $f(x) = ax + b$ na qual os parâmetros a e b são ajustados de modo que o gráfico de f passe pelos pontos $(1, 6.8)$ e $(11, 85.55)$. Assim, vamos escolher uma função que acerta precisamente dois dos dados da tabela. Essa escolha é um pouco arbitrária mesmo, **o objetivo do exercício é notar o erro que se comete ao fazer essa aproximação.**

Feita essa escolha, vamos agora determinar os parâmetros a e b . Sabemos que eles devem satisfazer $f(1) = 6.8$ e $f(11) = 85.55$. Logo

$$\begin{aligned} a + b &= 6.8 \\ 11a + b &= 85.55, \end{aligned}$$


e portanto

$$10a = 78.75 \implies a = 7.875.$$

Com o valor de a e com a primeira equação calculamos o valor de b , obtendo $b = -1.075$. Assim,

$$f(x) = 7.875x - 1.075.$$

Na figura abaixo plotamos o gráfico de f em vermelho: Para estimar o erro cometido, usamos o



valor médio dos desvios quadráticos, conhecido em estatística como **desvio padrão** (você pode escolher outra medida), calculado através da fórmula

$$\sigma = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} (f(i) - v(i))^2.$$

Com as escolhas que fiz obtemos um erro de 6.64, um erro muito alto. Observe que ele é quase igual a primeira entrada da tabela. \square

Exercício 2. Considere um objeto em queda livre no espaço e suponha que a altura do objeto ao longo do tempo possa ser descrita por uma função do tipo $y(t) = h_0 - ct^2$, onde $c > 0$ é um número real positivo e h_0 é a altura inicial. Determine a taxa de variação média da posição (ou seja, a velocidade média) do objeto num intervalo de tempo entre t e $t + \delta$, para $\delta > 0$.

Solução. A taxa de variação é calculada como a variação de $y(t)$ dividida pela variação de t . Como a variável t oscilou de um valor t ao valor $t + \delta$, temos então que a taxa de variação será

$$\frac{y(t + \delta) - y(t)}{t + \delta - t} = \frac{h_0 - c(t + \delta)^2 - [h_0 - ct^2]}{\delta} = \frac{ct^2 - c(t^2 + 2ct\delta + \delta^2) - [h_0 - ct^2]}{\delta} = \frac{ct^2 - ct^2 - 2ct\delta - \delta^2 c}{\delta} = 2ct - \delta c.$$

\square