Universidade Federal Fluminense
IME - Instituto de Matemática
GMA - Departamento de Matemática Aplicada

LISTA 1 - 2018-1

Integral definida
Teorema Fundamental do Cálculo
Área de regiões planas

Nos exercícios 1 a 10, calcule a integral indicada.

1. $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left((\sqrt[3]{t}\,)^2-2\right)dt$

2. $\displaystyle\int_{0}^{1}\frac{x-\sqrt{x}}{3}\,dx$

3. $\displaystyle\int_{1}^{3}\left(\frac{3}{x^2}-1\right)dx$

4. $\displaystyle\int_{1}^{2}\sqrt{\frac{2}{x}}\,dx$

5. $\displaystyle\int_{0}^{2}(2-s)\sqrt{s}\,ds$

6. $\displaystyle\int_{-1}^{1}|x|\,dx$

7. $\displaystyle\int_{0}^{4}\left|x^2-4x+3\right|dx$

8. $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\cos^3 x\,dx$

9. $\displaystyle\int_{2}^{3}\frac{x}{\sqrt{x-1}}\,dx$

10. $\displaystyle\int_{0}^{\frac{1}{2}}\frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$

11. Se aplicarmos o Teorema Fundamental do Cálculo em $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{x^2}\,dx$, obteremos a seguinte igualdade: $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{x^2}\,dx=-\frac{1}{x}\Big|_{-1}^{1}=-2$. Como a função $f(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$, isto não faz sentido. O que está errado?

Nos exercícios 12 a 16, derive a função dada.

12. $\displaystyle f(x)=\int_{-x}^{1}\frac{t^2-2t}{t^2+4}\,dt$

13. $\displaystyle f(x)=\int_{-\operatorname{sen}^2 x}^{x^4}\cos t^3\,dt$

14. $\displaystyle f(x)=x^2\int_{1}^{2\sqrt{x}}\sqrt{t^2+1}\,dt$

15. $\displaystyle F(x)=\int_{1}^{|\operatorname{sen} x|}\ln t\,dt$

16. $\displaystyle F(x)=\int_{0}^{\sqrt{x}}e^{t^2+1}\,dt$

Nos exercícios 17 e 18, calcule o limite indicado.

17. $\displaystyle\lim_{x\to\pi}\frac{\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{x}{2}}\cos(\operatorname{sen} t)\,dt}{(x-\pi)^3}$

18. $\displaystyle\lim_{x\to-1}\frac{\displaystyle\int_{-x}^{1}e^{t^2}\,dt}{(x+1)^3}$

Nos exercícios 19 a 25, calcule a área da região R descrita.

19. R é a região entre os gráficos de $y=x^2-1$ e $y=x+5$.
20. R é a região limitada pela curva de equação $y=x^2-2x$, pelo eixo x e pelas retas $x=-2$ e $x=4$.
21. R é a região entre a reta $x=2$ e a curva de equação $x=y^2+1$.
22. R é o conjunto dos pontos (x,y) tais que $x^2\le y\le\sqrt{x}$.
23. R é a região entre os gráficos de $y=|x|$ e $y=x^2$, com $-3\le x\le 3$.
24. R é a região delimitada pelas curvas de equações $y=x$, $xy^2=1$ e $y=2$.
25. R é a região delimitada pelos gráficos de $y=\operatorname{sen} x$ e $y=-\operatorname{sen} 2x$; $0\le x\le\pi$.
26. Esboce e encontre a área da região compreendida entre o eixo x e a hipérbole de equação $y=\dfrac{4}{x-1}$, para $2\le x\le 3$.
27. Esboce e encontre a área da região delimitada pelo gráfico de $y=\dfrac{3}{x-1}$, pela reta $x=-4$ e pelos eixos x e y.
28. Esboce e encontre a área da região limitada pelo gráfico de $y=e^x$ e pela reta que contém os pontos $(0,1)$ e $(1,e)$.
29. Esboce e encontre a área da região situada acima do eixo x, abaixo da reta de equação $y=1$ e limitada pelo gráfico de $y=\ln|x|$.

30. Determine m de modo que a área da região limitada por $y = mx$ e $y = 2x - x^2$ seja 36.

31. A reta de equação $y = 1 - x$ divide a região compreendida entre as parábolas de equações $y = 2x^2 - 2x$ e $y = -2x^2 + 2$ em duas partes. Mostre que as áreas das regiões obtidas são iguais e calcule o seu valor.

32. Seja f diferenciável. Calcule $\int_0^1 xf'(x)\,dx$, sabendo que $f(1) = 2$ e que $\int_0^1 f(t)\,dt$ é igual a área da região R entre o gráfico de $y = -x^2$ e as retas $y = 1$, $x = 0$ e $x = 1$. $\left(\text{sugestão: } \dfrac{d}{dx}(xf(x)) = f(x) + xf'(x)\right)$

RESPOSTAS

1. $-\frac{14}{5}$
2. $-\frac{1}{18}$
3. 0
4. $\left(4 - 2\sqrt{2}\right)$
5. $\frac{16}{15}\sqrt{2}$
6. 1
7. 4
8. $\frac{5}{12}\sqrt{2}$
9. $\dfrac{1}{3}\left(10\sqrt{2} - 8\right)$
10. $\dfrac{1}{2}\operatorname{arcsen}\dfrac{1}{4}$

11. De acordo com as hipóteses do Teorema Fundamental do Cálculo a função $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ teria que ser definida e contínua no intervalo $[-1, 1]$. Neste caso, a função não está definida em todos os pontos do intervalo $[-1, 1]$, pois não está definida em $x = 0$. Logo, não é possível aplicar o teorema para calcular a integral.

12. $f'(x) = \dfrac{x^2 + 2x}{x^2 + 4}$

13. $f'(x) = 4x^3 \cos x^{12} + \operatorname{sen} 2x \ \cos\left(\operatorname{sen}^6 x\right)$

14. $f'(x) = \sqrt{(4x + 1)x^3} + 2x \displaystyle\int_1^{2\sqrt{x}} \sqrt{t^2 + 1}\,dt$

15. $F'(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{|\operatorname{sen} x|}(\cos x) \ln|\operatorname{sen} x|$

16. $F'(x) = \dfrac{e^{x+1}}{2\sqrt{x}}$

17. ∞

18. ∞

19. $\displaystyle\int_{-2}^{3} \left((x + 5) - \left(x^2 - 1\right)\right) dx$

20. $\displaystyle\int_{-2}^{0} \left(x^2 - 2x\right) dx + \int_0^2 -\left(x^2 - 2x\right) dx +$
$$+ \int_2^4 \left(x^2 - 2x\right) dx = \frac{44}{3}$$

21. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \left(2 - \left(y^2 + 1\right)\right) dy = \frac{4}{3}$

22. $\displaystyle\int_0^1 \left(\sqrt{x} - x^2\right) dx = \frac{1}{3}$

23. $2\displaystyle\int_0^1 \left(x - x^2\right) dx +$
$$+2\int_1^3 \left(x^2 - x\right) dx = \frac{29}{3}$$

24. $\displaystyle\int_1^2 \left(y - y^{-2}\right) dy = 1$

25. $\displaystyle\int_0^{\frac{2\pi}{3}} (\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x)\,dx +$
$$+2\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} -(\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x)\,dx = \frac{5}{2}$$

26. área $= 4 \ln 2$

27. área $= 3 \ln 5$

28. área$= \dfrac{3 - e}{2}$

29. área $= 2e - 2$

30. $m = -4$

31. $\displaystyle\int_{-\frac{1}{2}}^{1} \left[\left(2 - 2x^2\right) - (1 - x)\right]\,dx =$
$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{1} \left[(1 - x) - \left(2x^2 - 2x\right)\right]\,dx = \frac{9}{8}$$

32. $\dfrac{2}{3}$