

uff Universidade Federal Fluminense
EGM - Instituto de Matemática
GMA - Departamento de Matemática Aplicada

LISTA 2 - 2015-1
Números reais:
propriedades algébricas
propriedades de ordem

1. Nas afirmações a seguir considere $x, y \in \mathbb{R}$. **Essas afirmações são falsas.** Use o exemplo de valor de x e de y dados juntos com cada afirmação para observar que a implicação não se verifica, isto é, um **contra-exemplo** que justifica a implicação ser falsa. Para que a implicação seja falsa, com esse exemplo numérico deve ser verificado que a hipótese é verdadeira e a tese é falsa. Depois leia a consequência escrita a seguir da afirmação.

(a) $3x(x^2 - 1) = 6x^2 \implies x^2 - 1 = 2x; \quad x = 0$
(consequência: nem sempre é possível cortar "x" dos dois lados de uma equação)

(b) $(x - 1)^2 = (2x - 3)^2 \implies x = 2; \quad x = \frac{4}{3}$
(consequência: nem sempre é possível cortar os expoentes iguais)

(c) $xy^2 > x(y + 1) \implies y^2 > y + 1; \quad x = -1 \text{ e } y = 1$
(consequência: nem sempre é possível cortar "x" dos dois lados de uma inequação)

(d) $\frac{x^2 - 1}{5x + 7} < 0 \implies x^2 - 1 < 0; \quad x = -2$
(consequência: nem sempre é possível multiplicar "em cruz" em uma inequação)

(e) $\frac{x - 1}{x - 2} > \frac{4}{x - 2} \implies x - 1 > 4; \quad x = 0$
(consequência: nem sempre é possível multiplicar "em cruz" em uma inequação)

2. Sejam $x, y \in \mathbb{R}$. Diga se as implicações ou as equivalências a seguir são verdadeiras ou se são falsas. Para as verdadeiras, redija uma justificativa. Para as falsas, apresente um contra-exemplo.

- | | |
|---|--|
| (a) $x^5 > 0 \iff x > 0$. | (i) $x^2y > 0 \implies x, y > 0$. |
| (b) $x^6 = 0 \iff x = 0$. | (j) $x^3y^5 < 0 \implies x > 0 \text{ e } y < 0$. |
| (c) $x > 2 \implies x \geq 3$. | (k) $x^2y \leq 0 \implies y < 0$. |
| (d) $x + y > 0 \implies x > 0 \text{ e } y > 0$. | (l) $xy \geq 0 \implies x, y \geq 0 \text{ ou } x, y \leq 0$. |
| (e) $x - y > 0 \implies x > 0$. | (m) $x^{218} \geq 0 \implies x \geq 0$. |
| (f) $xy > 0 \implies x > 0 \text{ e } y > 0$. | (n) $x \in \{3\} \implies x \in \{3, \pi\}$. |
| (g) $xy^2 > 0 \implies x > 0$. | (o) $x = 3 \implies x = 3 \text{ ou } x = \pi$. |
| (h) $x^2y < 0 \implies y < 0$. | |

3. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Diga quais das afirmações a seguir são falsas e quais são verdadeiras. Para as falsas, apresente um contra-exemplo. Para as verdadeiras, redija justificativas para sua resposta e diga se a recíproca é verdadeira.

- | | |
|--|---|
| (a) $a^5 < 0 \implies a < 0$. | (f) $a^4 = 16b^4 \implies a = 2b \text{ ou } a = -2b$. |
| (b) $a > 2 \implies a \geq 2$. | (g) $a^2 + b^2 = 0 \implies a = 0 = b$ |
| (c) $a^{111} \geq 0 \implies a \geq 0$. | (h) $a^{218} \geq 0 \implies a \geq 0$. |
| (d) $a^2 = b^2 \implies a = b$. | (i) $a + b > 0 \implies a > 0 \text{ ou } b > 0$. |
| (e) $a^3 = b^3 \implies a = b$. | |

4. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Diga quais das afirmações a seguir são falsas e quais são verdadeiras. Redija justificativas para suas respostas.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (a) $a > 0 \iff a^2 > 0$. | (f) $a^2 - b^2 = 0 \iff a^2 = b^2$. |
| (b) $a < 0 \iff a^3 < 0$. | (g) $a^2 = b^2 \iff a^4 = b^4$. |
| (c) $a^5 > 0 \iff a > 0$. | (h) $a^2 > b^2 \implies a > b$. |
| (d) $a^6 = 0 \iff a = 0$. | (i) $a^3 > b^3 \implies a > b$. |
| (e) $a \geq 2 \implies a > 2$. | (j) $a^2 + b^2 = 0 \iff a = 0 = b$ |

- (k) $a^3 + b^3 = 0 \iff a = 0 = b$
 (l) $a^2 = b^2 \implies a^3 = b^3$
 (m) $a^3 = b^3 \implies a^2 = b^2$
 (n) $a^2 = b^2 \implies (a + 1)^2 = (b + 1)^2$
 (o) $a^4 + b^4 = 0 \iff a = 0 = b$
 (p) $a^3 + b^4 = 0 \implies a < 0$
 (q) $a^3 + b^4 = 0 \implies a \leq 0$
 (r) $a^3 + b^4 = 0 \iff a \leq 0$
 (s) $a^2 + b^4 = 0 \iff a = 0 = b$

5. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Diga quais das afirmações a seguir são falsas e quais são verdadeiras. Redija justificativas para suas respostas.

- (a) $\forall a \neq 0$, temos que: $\frac{1}{a} < b \iff ab > 1$
 (b) $\forall b \neq 0$, temos que: $\frac{1}{b^2} < a \iff ab^2 > 1$
 (c) $\forall b < 0$, temos que: $\frac{1}{b^3} < a \iff ab^3 < 1$
 (d) $\frac{1}{a^2 + b^2} \geq 0 \quad \forall a \neq 0 \text{ e } b \neq 0$.
 (e) $\frac{1}{a^2 + b^2} > 0 \quad \forall a \neq 0 \text{ e } b \neq 0$.
 (f) $a > b \implies \frac{1}{a^2 - b^2} \geq 0$
 (g) $a > b > 0 \implies \frac{1}{a^2 - b^2} \geq 0$
 (h) $\forall a \neq 0, b \neq 0$, temos $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \implies b < a$
 (i) $\forall a > 0, b > 0$, temos $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \implies b < a$
 (j) $\forall a > 0, b < 0$, temos $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} \iff b < a$

6. Dê dois exemplos de afirmações cuja implicação é verdadeira e a recíproca é falsa.

7. Encontre o maior subconjunto dos reais em que cada identidade é verdadeira. Verifique que, de fato, a identidade é verdadeira nesse subconjunto.

(a) $\frac{\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x^2-1}}{\frac{1}{x+1} - \frac{2x-2}{x-2}} = \frac{1}{1-x}$
 (b) $\frac{x^5 - 1}{x^4 - 1} = \frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^3 + x^2 + x + 1}$

8. Considere $x \in \mathbb{R}$, encontre o domínio(*) de cada equação ou inequação abaixo e resolva-a. Em qualquer resolução pense sempre na propriedade que está usando para resolver.

(*) O domínio de uma equação ou inequação são todos os valores de x em que é possível calcular qualquer expressão contida na equação ou inequação.

- (a) $(x^3 - x)(32 + x^5) = 0$
 (b) $(x - 1)(x + 2) = 4$
 (c) $(x - 1)^2(x^2 + 4x) = x^2 - x$
 (d) $\frac{1}{x} < \frac{1}{x(x-1)}$
 (e) $x^2 + 4x + 5 > 0$
 (f) $x^3 - x^2 \geq x(x - 1)$
 (g) $\frac{\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x^2-1}}{\frac{1}{x+1} - \frac{2x-2}{x-2}} \geq 0$
 (h) $\frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^3 + x^2 + x + 1} < 0$

9. Considere $x \in \mathbb{R}$ e analise o sinal(*) das expressões:

(a) $E(x) = \frac{(x^2 + 4x + 5)(x^2 + 4x - 3)^3}{(4 - 15x)(2 - 9x)^2}$
 (b) $E(x) = \frac{4}{x-2} - \frac{8}{x-1}$
 (c) $E(x) = \frac{x}{(2x-1)^2} - \frac{3}{4x^2-1}$
 (d) $E(x) = 4 - x - \frac{1}{x-2}$

(*) Lembre que analisar o sinal de uma expressão significa:

- Encontrar o(s) intervalo(s) onde a expressão $E(x)$ pode ser calculada.
- Encontrar o(s) valores de x onde a expressão $E(x) = 0$.
- Encontrar o(s) intervalo(s) onde a expressão $E(x) > 0$.
- Encontrar o(s) intervalo(s) onde a expressão $E(x) < 0$.